

【認識茲卡病毒感染症】

茲卡病毒(Zika virus)是一種經病媒蚊傳播的黃病毒(Flavivirus)，過去茲卡病毒感染症僅在非洲和亞洲有散發病例報告。2015 年下半年起茲卡病毒在中南美洲快速擴散，並觀察到巴西流行疫區嬰兒小頭畸形(microcephaly) 個案數顯著增加，且包括巴西等多個流行地區急性多發性神經炎「格林-巴利症候群」(Guillain-Barre Syndrome，GBS)個案數也有增加的情形，茲卡病毒感染症因而成為全球公共衛生關注的議題。由於國際間疫情規模擴散迅速，且懷疑嬰兒小頭畸形及神經學後遺症與茲卡病毒感染有因果相關，世界衛生組織 (World Health Organization，WHO)於 2016 年 2 月 1 日宣布茲卡病毒感染症符合「國際公共衛生緊急關注事件」(Public Health Emergency of International Concern，PHEIC)，疾病管制署也同步成立中央流行疫情指揮中心，並將茲卡病毒感染症列為法定傳染病。.....

(文摘自醫療品質雜誌第 11 卷第 1 期感染管制，李彥儀等人著)

本期其他精彩內容：

〈建構女性友善醫療環境〉

〈運用多面向策略改善病人家屬手部衛生〉

#醫療品質雜誌

=====

◎雜誌訂閱：<https://goo.gl/AqHOQk>

◎購買電子雜誌：

1. <http://ebook.hyread.com.tw/magazine.jsp?jid=2>

2. <https://goo.gl/aGRJDk>

◎ 本雜誌提供「感染管制」與「性別議題」通訊繼續教育積分

孕婦或計畫懷孕婦女 請注意!!!

孕婦感染可能導致胎兒小頭畸形或死亡，建議暫緩前往流行地區。從流行地區返國後，並定期胎兒超音波追蹤及告知醫師旅遊史。

十秒讀懂茲卡病毒 (Zika virus)

症狀

- 發燒
- 頭痛
- 關節疼痛
- 斑丘疹
- 結膜炎

怎麼預防?

- 使用紗窗紗門 避免蚊蟲
- 穿著淺色長袖長褲
- 避免學生源
- 避免被蚊蟲叮咬

潛伏期

3 ~ 12 天

返國注意事項：有任何不適撥打免付費 1922

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC
www.cdc.gov.tw
1922防疫達人
www.facebook.com/TWDCDC
Taiwan CDC LINE@
免付費疫情通報及諮詢專線：1922 AD

圖片來源：疾病管制署