

10.3966/199457952021031502012

很容易被誤診的兒童疥瘡 Scabies in Childhood : Easy Misdiagnosis

黃高彬¹

¹中國醫藥大學附設醫院感染管制中心

Kao-Pin Hwang¹

¹Center for Infection Control, China Medical University Hospital

兒童時期的皮膚感染性疾病有別於成人，其感染部位和臨床表現往往不典型，兒童又不會詳細描述病灶的感覺，只會哭鬧或睡眠不好，把父母或其他照顧者搞得雞飛狗跳，特別是小孩子感染疥瘡，常常被誤診為濕疹、皮膚過敏、異位性皮膚炎、濃痂疹、冬季癢（如：蓋被子時會很癢）等，當沒有被確診之前，所有治療幾乎都不會有效，導致小兒一直受到皮癢之苦。

疥瘡是感染到「人疥蟎」所致，雌性成蟲大小約0.3mm，肉眼無法看到成蟲，會在皮膚角質層下挖掘皮下隧道，並至小隧道中產卵，每天平均產下3-4個蟲卵，在挖掘隧道產卵及排泄過程中會引起皮膚的劇癢。另外，也有動物的疥蟲，如貓疥蟲和狗疥蟲，雖與人類疥蟲不同，但是，也會感染人類，只是症狀較不嚴重而已。

疥瘡如何傳染？

疥瘡是經由皮膚接觸到別人身上或布類上的疥蟲而感染，在皮膚親密接觸時最容易感染，若衣服、布類上有疥蟲存在，也可因接觸而感染，如布沙發或布窗簾也會導致傳染，因為，疥蟲可以在體外存活1至2週，這段期間均有可能因接觸而造成感染。在家庭中，往往因為皮膚的接觸，如父母與子女最容易互相傳染，共用的沙發、衣服、棉被及床單等均會傳

染疥蟲。家中有行動不變的長輩也常因個人衛生無法自理，感染後再傳給家中其他人，尤其是小孩，因為皮膚較嫩，很容易被傳染（圖1）。公共使用的地方，如旅館、軍營、公司宿舍、工廠休息室、監獄、學校宿舍、精神科醫院及長期照護機構等，均容易發生感染或群聚現象，醫院中的加護病房、精神科病房或呼



圖1 小孩常因搔抓和皮膚接觸導致疥瘡散佈